



## **Ohutsuolen magneettitutkimus**

Pyydämme Sinua saapumaan radiologian yksikköön 1 tunti ennen varsinaista tutkimusaikaa. Tutkimus kestää esivalmisteluineen 1 ½ – 2 tuntia. Magneettiyksikössä kuvataan myös päivystyspotilaita, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia kuvausaikatauluun.

### **Tutkimukseen valmistautuminen**

- Jos Sinulla on käytössä rautalääkitys, se on lopetettava vähintään 5 päivää ennen tutkimusta.
- Suoliston tyhjennystä varten saat Toilax-tabletit lähettävän yksikön/sisätautipoliklinikan hoitajalta.

### **Tutkimusta edeltävänä päivänä**

- Saat syödä vähärasvaista ja vähäkuituista ruokaa: vaaleaa leipää, mehukeittoa, perunaa, vähärasvaista kalaa ja kanaa-
- Älä syö lihaa, kasviksia, hedelmiä, puuroa, täysjyväleipää, voita, äläkä käytä maitotuotteita.
- Ota klo 16 kaksi suolistoa tyhjentävää Toilax-tablettia veden kanssa. Tämän jälkeen voit vielä syödä edellä mainitun mukaisesti.

### **Tutkimuspäivänä**

- Ole syömättä ja juomatta 4 tuntia ennen varattua aikaa.
- Lääkärin määräämät lääkkeet saat ottaa pienen vesimäärän kanssa.

### **Tutkimus**

- Tuntia ennen kuvausta Sinulle annetaan juotavaksi 1,5 l Mannitol-liuosta. Liuos juodaan 2 dl:n annoksina 5 minuutin välein.
- Ennen kuvausta Sinulle annetaan lihakseen suolta rentouttava lääke.
- Tutkimuksen aikana Sinulle annetaan laskimoon varjoainetta, joka ei sisällä jodia. Tehosteaine poistuu elimistöstä virtsan mukana.

### **Tutkimuksen jälkeen**

- Juotava Mannitol-liuos ei imeydy suolesta, joten se saattaa aiheuttaa tutkimuksen jälkeen vatsan toiminnan vilkastumista ja suolen tyhjenemistä.
- Tutkimuksen jälkeen voit syödä normaalisti.

**Tutustu magneetin esitietolomakkeeseen huolella etukäteen ja tuo se täytettynä mukanasi tutkimukseen.**

**Perumatta jätetystä ajasta peritään asetuksen mukainen sakkomaksu.**