



OHJE ULTRAAÄNESSÄ TEHTÄVÄÄN SISÄELIMEN NEULANÄYTTEESEEN TULEVALLE POTILAALLE

Toimenpidepäivä _____ suunniteltu aika _____

Saavutte osastolle _____ päivä _____ klo _____

Toivomme teidän tutustuvan näihin ohjeisiin ja säilyttävän ne myöskin tutkimusta seuraavaan päivään.

Teiltä on löydetty sellainen sisäelimestä oleva muutos, jonka tarkempi tutkimus neulanäytteellä on tarpeellista. Näytteen ottaa lääkäri käyttäen apunaan ultraäänilaitetta neulan ohjaamiseksi haluttuun kohteeseen. Pistoskanava puudutetaan ja toimenpiteeseen liittyvä kipu on lievää.

Esivalmistelut:

- Asetosalisylihappoa (mm. Aspirin®, Disperin®, Primaspan®) sisältävät särkylääkkeet on lopetettava viikko ennen toimenpidettä. Muut särkylääkkeet on lopetettava 2 vuorokautta ennen toimenpidettä. Muista lääkkeistä ainoastaan parasetamolia (mm. Panadol®, Paratabs®, Panacod®) sisältäviä lääkkeitä saa käyttää
- Tarvittavista laboratoriotutkimuksista antaa hoitava lääkäri erillisen lähetteen.
- Jos vatsan tai nivustaipeen iholla on ihottumaa, naarmuja tai haavoja, ottakaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin sen arvioimiseksi, onko näytteenotto mahdollista suorittaa.
- Ennen tutkimukseen tuloa on peseydyttävä huolellisesti.
- Näytteenottopäivänä saa nauttia kevyen aamupalan. Runsasta ateriaa ei pidä syödä.

Jälkiseuranta:

- Näytteenoton jälkeen on seuranta-aika sairaalan osastolla 6 tuntia, minkä jälkeen pääsee kotiin.
- On kuitenkin varauduttava jäämään yön yli sairaalaan, mikäli sivuoireita ilmenee.
- Toimenpiteen jälkeen ei itse saa ajaa autolla kotiin.
- Seuraavana yönä kotona on oltava varmuudeksi aikuinen seurana.
- Syömättä ollaan 6 tuntia, pieniä määriä nestettä saa juoda.
- Mikäli toimenpiteen jälkeen ilmenee merkittäviä vatsakipuja, on syytä ottaa yhteys sairaalan päivystykseen puh. (03) 4191 3000.

Perumatta jätetystä ajasta peritään asetuksen mukainen sakkomaksu.